

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plynnny-nawoz-makroelementowy-kukurydza-agrischmith-kukurydza-liqid-a-20-l-p-58626.html>



Płynny nawóz makroelementowy kukurydza agriSchmith kukurydza liqid a' 20 l

Cena brutto	192,88 zł
Cena netto	156,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SAGRI NP KUKU20L
Kod producenta	SAGRI NP KUKU20L
Kod EAN	5902004771762
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Płynny nawóz makroelementowy agriSchmith kukurydza liquid 20 l

Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy dedykowany uprawie kukurydzy. Zawiera zestaw mikroelementów w postaci siarczanów oraz tlenek siarki, dostosowany do specyficznych potrzeb pokarmowych kukurydzy w kluczowych fazach rozwojowych.

Pojemność 20 litrów

Tlenek siarki (SO₃) 6,4% (S=2,6%)

Forma stosowania Dolistnie

Klasyfikacja PFC 1(C)(I)(b)(i)

Charakterystyka nawozu

Kompleksowy zestaw mikroelementów

Zawiera sześć mikroelementów (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) w formach łatwo przyswajalnych przez kukurydzę. Postać siarczanowa większości składników zapewnia szybką dostępność dla roślin po aplikacji dolistnej.

Wysokie stężenie siarki

Zawartość 2,6% siarki elementarnej (6,4% SO₃) wspiera syntezę białek i chlorofilu. Siarka jest szczególnie istotna dla kukurydzy w fazie intensywnego wzrostu wegetatywnego i budowy masy zielonej.

Aplikacja w kluczowych fazach

Formuła dostosowana do stosowania w fazach 3-4 liści, 6-8 liści oraz od wzrostu źdźbła do początku rozwoju wiechy – momentów największego zapotrzebowania na mikroelementy i siarkę.

Forma płynna

Płynna konsystencja ułatwia precyzyjne dozowanie, szybkie rozpuszczanie w wodzie oraz równomierne pokrycie powierzchni liści. Nie wymaga dodatkowego rozpuszczania stałych form.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SAGRI NP KUKU20L
Pojemność opakowania	20 litrów
Klasyfikacja nawozu	PFC 1(C)(I)(b)(i) – prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
Tlenek siarki (SO ₃) całkowity	6,4% (m/m) – co odpowiada 2,6% siarki elementarnej (S)
Bor (B) całkowity	0,38% (m/m) – w postaci soli sodowej
Miedź (Cu) całkowita	0,55% (m/m) – w postaci siarczanu
Żelazo (Fe) całkowite	0,53% (m/m) – w postaci siarczanu
Mangan (Mn) całkowity	0,55% (m/m) – w postaci siarczanu
Molibden (Mo) całkowity	0,10% (m/m) – w postaci soli amonowej
Cynk (Zn) całkowity	0,10% (m/m) – w postaci siarczanu
Składniki bazowe	Kwas cytrynowy jednowodny (CAS 5949-29-1), Siarczan manganu jednowodny (CAS 10034-96-5)

Dawkowanie i terminy aplikacji

Kukurydza – zalecane dawki

Faza 3-4 liści: 2,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody – wsparcie początkowego rozwoju systemu korzeniowego i aparatu asymilacyjnego

Faza 6-8 liści: 2,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody – intensywny wzrost wegetatywny, zwiększone zapotrzebowanie na mikroelementy

Wzrost źdźbła – początek rozwoju wiechy: 2,0-4,0 l/ha w 200-300 l wody – wsparcie formowania organów generatywnych

Dawka nawozu zależy od stanu odżywienia plantacji, zasobności gleby oraz planowanego plonu. Niższe dawki stosuje się profilaktycznie, wyższe przy widocznych niedoborach lub na glebach ubogich w mikroelementy. Zaleca się wykonanie analizy liściowej przed aplikacją.

Znaczenie składników dla kukurydzy

Siarka (S)

Składnik aminokwasów siarkowych (metionina, cysteina) oraz witamin z grupy B. Niedobór siarki objawia się jasnozielonym przebarwieniem młodych liści i ograniczonym wzrostem. Kukurydza pobiera siarkę intensywnie w fazie od 4 liści do kwitnienia.

Bor (B)

Uczestniczy w podziale komórkowym, transporcie cukrów i tworzeniu ścian komórkowych. Niedobór boru prowadzi do zaburzeń wzrostu wierzchołka wzrostu, deformacji kolb i słabego zapylenia.

Miedź (Cu)

Aktywator enzymów oddechowych i fotosyntezy. Niedobór miedzi objawia się skręcaniem i więdnieniem końców młodych liści. Szczególnie istotna na glebach organicznych i po wapnowaniu.

Żelazo (Fe)

Niezbędne do syntezy chlorofilu i procesów oddechowych. Niedobór żelaza powoduje chlorozę międzyżyłkową młodych liści - żółknięcie blaszki przy zielonych żyłkach.

Mangan (Mn)

Współdziała w fotosyntezie i metabolizmie azotu. Niedobór manganu objawia się jasnozielonymi przebarwieniami między żyłkami starszych liści. Częsty na glebach o pH powyżej 6,5.

Molibden (Mo)

Składnik enzymów redukujących azotany. Niedobór molibdenu ogranicza wykorzystanie azotu przez roślinę, co prowadzi do zahamowania wzrostu mimo dostępności azotu w glebie.

Cynk (Zn)

Reguluje syntezę auksyn i metabolizm węglowodanów. Niedobór cynku objawia się białymi przebarwieniami na młodych liściach i skróceniem międzywęźli. Częsty na glebach o wysokim pH i po nadmiernym nawożeniu fosforowym.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

Warunki magazynowania

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, w

temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Częściowo wykorzystane opakowania należy dokładnie zamknąć, aby zapobiec wylaniu i kontaktowi z powietrzem.

Nawóz nie może być przechowywany razem z środkami ochrony roślin, paszami ani materiałami łatwopalnymi. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. Unikać kontaktu z oczami i skórą – stosować rękawice ochronne podczas przygotowywania roztworu roboczego.

...